



World Health
Organization

Sudan



بروتوكول علاج داء السعير أو (داء الكلب) Rabies



تعريف الحالة

الحالة المشتبهة:

- التعرض لعضة أو خدش من كلب أو أي حيوان آخر .
- التعرض للعباب حالة مشتبهة لكلب أو أي حيوان آخر
- مخالطة حالة مؤكدة لكلب أو أي حيوان آخر.

الحالة المحتملة:

بالإضافة إلى ما ذكر في وصف الحالة المشتبهة:

شكوى من حمى ، وخذو ألم حاد في مكان العضة ، خوف من الماء والهواء ، هياج عصبي ، شلل وتشنج عضلات البلع وزيادة في سرعة التنفس.

الحالة المؤكدة:

يتم التأكيد للأشخاص المصابين باستخدام :

- فحص (PCR).
- الفحص النسيجي لأنسجة مخ الحيوان.

الأعراض

تمتد فترة حضانة داء الكلب عادة من شهرين إلى 3 أشهر ، ولكنها قد تتراوح ما بين أسبوع وسنة ، ويتوقف ذلك على عوامل مثل موضع دخول الفيروس إلى الجسد والحمل الفيروسي .

قد تكون الأعراض الأولى لداء الكلب مشابهة للإنفلونزا (مثل : الضعف أو عدم الراحة أو الحمى أو الصداع) ، ويكون هناك إحساس بعدم الراحة أو الوخز أو الحكة في مكان العضة ، وقد تستمر هذه الأعراض لعدة أيام ، ومع انتقال الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي يحدث التهاب تدريجي ومميت في الدماغ والحبل الشوكي.

أنواع داء الكلب

1 - داء الكلب الهياج:

و يتسبب في فرط النشاط والسلوك الإنفعالي والهلوسة ورهاب الماء (الخوف من الماء) ، ورهاب الهواء (الخوف من تيارات الهواء) ، وتحدث الوفاة بعد بضعة أيام بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي .

2 - داء الكلب الشللي :

وفي هذا النوع تصاب العضلات بالشلل تدريجياً بدءاً من مكان الجرح ، ويدخل الشخص ببطء في حالة غيبوبة ويتوفى في نهاية المطاف .

العلاج الوقائي بعد التعرض للعض أو الخدش

تتضمن الإجراءات الوقائية ما يلي:

- طمأنة المريض وذويه .
- الغسل المكثف لمكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل .
- تحويل المريض لأقرب وحدة صحية لعلاج الجرح موضعياً وأخذ اللقاحات المخصصة .

فئات العلاج الوقائي

الفئة	وصف الحالة	العلاج
الفئة الأولى	لمس الحيوان أو إطعمه أو لحس الحيوان للجلد السليم	غسل أسطح الجلد المعرضة
الفئة الثانية	قرص الحيوان للجلد المكشوف أو الخدش أو السحج الطفيف دون نزف	غسل الجروح والتطعيم الفوري
الفئة الثالثة	عضة أو خدشة واحدة أو أكثر تتخلل الأدمة أو تلوث الأغشية المخاطية أو الجلد المقطوع بلعاب الحيوان نتيجة للحس أو التعرض الناجم عن المخالطة للخفافيش	غسل الجروح والتطعيم الفوري وإعطاء الغلوبولين المناعي المضاد داء الكلب

لقاح السعير

- يوجد اللقاح في شكل بكرة تحل بالمحلول ويستخدم خلال ساعة واحدة
- يعطى اللقاح في عضلة اليد بالتناوب وليس البطن .
- في حالة العضات القريبة من الرأس ينصح بأخذ جرعة من المصل بجانب اللقاح .
- الجرعات خمس جرعات تعطى كالآتي :

الرقم	الجرعات	زمن أخذ الجرعة
1	الأولى	يوم العضة
2	الثانية	اليوم الثالث من التعرض
3	الثالثة	اليوم السابع من التعرض
4	الرابعة	اليوم الـ (14) من التعرض
5	الخامسة	اليوم الـ (28) من التعرض

مع تحيات اللجنة القومية لمعالجة الحالات وإدارة الطوارئ الاتحادية - أغسطس 2024